Neurologie

Vorname: ☐ ♀ ☐ ♂

Name: Geburtsdatum

Patienten- ID: 2 0 ☐ ☐ - ☐☐☐☐☐

Arbeitsdiagnose / Schlüsselsymptome: NUP-Arzt: Uhr

Versorgungsituation:

unabhängig zu Hause ☐ Pflege zu Hause ☐ Institution ☐

Zeit von Symptombeginn bis Eintreffen ZNA:

0-3 ☐ 3-4,5 ☐ 4,5-6 ☐ 6-12 ☐ 12-24 ☐ 24-72 ☐ >72 ☐

Dauer der Schlüsselsymptome:

<1h ☐ 1-24h ☐ >24h ☐ Gegenwärtig anhaltend ☐

Bewusstsein:

wach ☐ somnolent ☐ soporös ☐ komatös ☐

Orientiert:

Ort: J N Zeit: J N Person: J N Situation: J N

Amnesie: J N

anterograd ☐ retrograd ☐ Altgedächtnis ☐ Neugedächtnis ☐

Nosologische Einordnung:

Menigitis / Enzephalitis

bakteriell ☐ viral ☐ autoimmun ☐

Schlaganfall / Ischämie

Ischämie ☐ ICB ☐ SDH ☐ EDH ☐ SAB ☐

Kopfschmerz / Rückenschmerz / Schwindel

VAS:

Neuromuskuläre Erkrankungen

Myasthenia gravis ☐ Guillain Barré ☐ **Besinger Score:**

Epileptische Anfälle

Fokal ☐ Komplex partiell ☐ Generalisiert ☐ Status ☐

Medikamentös durchbrochen J N

Medikament: _____

Metabolisch / Toxisch / Enzephalopathisch

Renal ☐ Hepatisch ☐ Septisch ☐ Ethyltoxisch ☐

Andere ☐ _____

Komorbidität:

Infekt ☐ CRP ☐☐☐ mg/l Leukozyten ☐☐☐ 10^9/l

Diabetes mellitus ☐ AHT ☐ KHK ☐ Demenz ☐

Früherer Apoplex ☐ Tumorleiden ☐

Sprache/Neuropsychologie:

klar und flüssig ☐ verwaschen ☐ Wortfindungsstörung ☐

nicht-flüssige Aphasie ☐ flüssige Aphasie ☐

globale Aphasie ☐ Neglect ☐ Apraxie ☐

Kopf:

frei beweglich J N

Meningismus J N endgradig ☐

Nackenrigor: positiv ☐ negativ ☐

Druckdolenz: positiv ☐ negativ ☐

NAP:

N. supraorbitalis: positiv ☐ negativ ☐

N. infraorbitalis: positiv ☐ negativ ☐

N. mentalis: positiv ☐ negativ ☐

Hirnnerven:

Geruchsempfinden anamnestisch intakt J N

Visus unkorrigiert ☐ korrigiert ☐

Visusverlust R L Gesichtsfeld fingerperimetrisch intakt R L

Oculomotorik intakt R L

Doppelbilder J N Ptosis R L

Nystagmus R L Horner J N

Konvergenz J N

Pupillenweite			Pupillenreaktion		
R	eng	L	R	prompt	L
R	mittel	L	R	langsam	L
R	weit	L	R	keine	L

Gesichtssensibilität intakt R L

Bei Bewußtlosigkeit: Oculocephaler Reflex: vorh. R path.

Cornealreflex normal R L abgeschwächt R L

Mimische Muskulatur opB R L vermindert R L

Augenschluss gestört R L

Gehör subjektiv opB R L Hypakusis R L

Gaumensegel symmetrisch J N

Schluckakt subjektiv unbehindert J N Zunge frei bew. J N

Reflexstatus:

normal ++ fehlt Ø vermindert + gesteigert +++

	R	L		R	L
Bicepsreflex			**Tricepsreflex**		
Quadricepsreflex			**Trömnerzeichen**		
Adduktorenreflex			**Bauchhautreflex**		
Achillessehnenreflex					

Babinski negativ R L positiv R L

Motorik:

Hemiparese J N armbetont R L beinbetont R L

Pronation J N R L

Paraparese J N Höhe: _____

Isolierte Muskelatrophie J N Wo?: _____

Lasègue R _____° L _____°

Faszikulationen: J N Wo?: _____

Tonus: unauffällig ☐ erhöht ☐ Wo?: _____

Rigor: J N Wo?: _____

Koordination:

Gangbild: _____

Trendelenburg R L sensibel ataktisch J N spastisch J N

Romberg: sicher ☐ Fallneigung R L

Unterberger: unauffällig ☐ Abweichung: _____

Finger-Nase: sicher ☐ dysmetrisch ☐

Tremor R L Beschreibung: _____

Unwillkürliche Bewegung: J N Beschreibung: _____

Sensibilität:

Berührungsempfinden: opB ☐ ☐ Befund: _____

Schmerzempfinden: opB ☐ ☐ Befund: _____

Hypästhesie R L Hyperpathie R L Allodynie R L

Reithosenareal: opB ☐ ☐ Befund: _____

Neglect: J N

Vibrationsempfinden:	HG	FG
rechts:	/8	/8
links:	/8	/8

Bildgebung:

CT ☐ CTA ☐ MRT ☐ DSA ☐

Zeit vom Eintreffen in ZNA bis Bildgebung:

<1h ☐ 1-3h ☐ >3h ☐

Weitere Diagnostik:

Labor ☐ Ultraschall/Doppler ☐ EEG/el. Physiologie ☐ LP ☐

Befund Bildgebung / Diagnostik:

ICB / SAB / SDH / EDH:

Ventrikeleinbruch J N Seitenventrikel R L

3. Ventrikel ☐ 4. Ventrikel ☐

GRAEB Score: ☐☐ 1-4 mild ☐ 5-8 moderate ☐ 9-12 severe ☐

ICB Volumen: 0-15 ml ☐ 15-30 ml ☐ >30 ml ☐

Aneurysma/AVM J N

WFNS: I II III IV V

Hunt & Hess: 1 2 3 4 5

Neurochirurgische / Neuroradiologische Intervention:

Cerebrale Ischämie: J N

NIHSS: ☐☐ Gewicht: ☐☐☐ kg BZ: ☐☐☐ mg/dl

INR: ☐☐☐ Thrombos: ☐☐☐ 10^9/l

CT-Frühzeichen:

Hypodensitäten J N <1/3 MCA Territorium ☐

>1/3 MCA Territorium ☐

HCMAS R L

ASPECTS Score: 0-7 ☐ 8-10 ☐

Thrombolyse:

IV-Lyse ☐ IA-Lyse ☐

Door-to-Needle-Time:

0-30 min ☐ 30-60 min ☐ 60-120 min ☐ >120 min ☐

Substanz: _____

Dosis: _____

Device: _____

Diagnose / Bemerkungen:

Unterschrift Arzt: _____